

Der subkutane Zugang

Einlegen einer Infusion in die Subklavikulargegend

Nach Abschluss meiner Höheren Fachausbildung Palliative Care SBK (2005) beschäftigte ich mich weiter mit dem Thema subkutane Infusion. Ich machte mir Gedanken, wie ich Arbeitskolleginnen und Kollegen für eine subkutane Infusion begeistern kann und wie sie diese in der Praxis anwenden können. So entstand der Film: Der subkutane Zugang Einlegen einer Infusion in die Subklavikulargegend.

Das Einlegen einer Infusion in die Subklavikulargegend wird durch diesen Film einzigartig nachvollziehbar.

Für Pflegende und Lernende entsteht so ein Beispiel für einen hervorragenden Praxistransfer, da er von Pflegenden für Pflegende entwickelt wurde.

Im Film sind die Besonderheiten der subkutanen Infusion dargestellt und kommentiert:

- Einstichstelle abmessen 3-5 cm unter dem Schlüsselbein
- Anästhesierendes Pflaster aufkleben (1 Stunde einwirken lassen)
- Pflegematerial ist geordnet auf einer Ablagefläche sichtbar
- Hautdesinfektion
- Hautfalte, Einstechen der Butterfly Kanüle mit Verlängerung (30-45 Grad Einstichwinkel zur Hautoberfläche) circa 1 cm weit vorschieben
- Butterfly und Schlauch mit einer durchsichtigen Klebefolie fixieren
- Die entlüftete Infusionsleitung an die Butterfly Kanüle anschliessen
- Tropfgeschwindigkeit nach Anordnung einstellen